



Semnan University



Research Article

Evaluation of toxic anions and cations of dairy cows' drinking water Mashhad suburb dairy farms

Nasim Mirblook¹, Amir Moghaddam Jafari^{1*}

Abstract

Dairy cow performance in terms of food consumption and growth, reproduction, milk production with high quality, hygiene, and health, has a direct relationship with water without anti-quality agents. The purpose of the present study was to evaluate the quality of drinking water in dairy farms of Mashhad suburb, Iran in terms of some chemical contaminations. Therefore, 1 liter of water samples was taken from 30 dairy units under standard conditions, and heavy metals including lead, mercury, arsenic, cadmium and nitrate, and sulfate ions were measured by Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES). After calculating and recording the descriptive statistical indices, data were analyzed in terms of comparing averages with existing standards for each parameter, as well as comparing the contamination rate in different geographical areas using SPSS software. The results showed that the nitrate and sulfate concentrations in all farms were lower than standard values, also, arsenic, lead, and mercury concentrations in all units and cadmium levels in 10 farms were exceeded. It was also found that there was no significant difference in the amount of heavy metal between the four studied geographic areas while there was for the two factors, nitrate and sulfate ($P < 0.05$). The existence of industrial estates, busy highways, and thermal power plant located around the Mashhad city that have the potential for entering pollutants and heavy metals into the environment, also, penetration of chemical fertilizers and industrial and domestic wastewater into groundwater are possible causes of contamination of livestock drinking water with heavy metals and chemical pollutants.

Keywords: Drinking water, Dairy farms, Mashhad, Toxic anions and cations.

1. Department of Basic Sciences, Veterinary School, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

*Corresponding author: moghaddamjafari@um.ac.ir


DOI: [10.22075/jvlr.2025.35757.1135](https://doi.org/10.22075/jvlr.2025.35757.1135)

Received: 28.10.2024

Accepted: 07.05.2025

How to Cite this Article:

Moghaddam Jafari, A., & Mirblook, N. (2025). Evaluation of toxic anions and cations of dairy cows' drinking water Mashhad suburb dairy farms. 17(1), 41-49. doi:10.22075/jvlr.2025.35757.1135



©2025 The Author(s): This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, As long as the original authors and sources are cited. No permission is required from the authors or the publishers



ارزیابی تعدادی از آنیون‌ها و کاتیون‌های مخاطره‌آمیز آب شرب بر سلامت گاوهای شیری در گاوداری‌های صنعتی حومه مشهد

نسیم میربلوک^۱، امیر مقدم جعفری^{۱*} ID

خلاصه

عملکرد گاو شیری از نظر میزان مصرف غذا و رشد، تولیدمثل، تولید شیر با کیفیت مطلوب، بهداشت و سلامتی، رابطه مستقیمی با مصرف آب عاری از عوامل ضدکیفی دارد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی کمیت تعدادی از آنیون‌ها و کاتیون‌های مضر در آب شرب گاوداری‌های شیری حومه مشهد انجام شد. بدین منظور نمونه‌ای آب از منابع آب ۳۰ واحد گاوداری در شرایط استاندارد اخذ و مقادیر کاتیون‌های مخاطره‌آمیز شامل فلزات سنگین از جمله سرب، جیوه، آرسنیک، کادمیوم و همچنین آنیون‌های مضر از جمله یون‌های نیتрат و سولفات توسط دستگاه اسپکترومتری نشری پلاسمایی جفت شده القایی (ICP-OES) اندازه‌گیری شدند. پس از محاسبه و ثبت شاخص‌های آماری توصیفی، آنالیز داده‌ها در قالب مقایسه میانگین‌ها با استانداردهای موجود برای هر یک از پارامترها، همچنین مقایسه میزان آلاینده‌ها در مناطق جغرافیایی مختلف با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج نشان داد که غلظت نیترات و سولفات گاوداری‌های صنعتی مورد مطالعه کمتر از مقادیر استاندارد بوده است، در حالیکه غلظت آرسنیک، سرب و جیوه در تمام واحدهای گاوداری صنعتی مورد مطالعه و غلظت کادمیوم در ۱۰ گاوداری تحت بررسی بیشتر از حد مجاز بود. همچنین مشخص گردید که تفاوت معنی‌داری از نظر مقادیر فلزات سنگین بین چهار منطقه جغرافیایی مورد بررسی وجود ندارد. در حالی که برای دو فاکتور نیترات و سولفات تفاوت توزیع جغرافیایی وجود داشت ($p < 0.05$). وجود شهرک‌های صنعتی، بزرگراه‌های پرترافیک و نیروگاه‌های حرارتی مستقر در اطراف مشهد، آلودگی سفره‌های آب زیرزمینی با کودهای شیمیایی و فاضلاب‌های صنعتی از عوامل احتمالی آلودگی آب شرب واحدهای صنعتی دامپروری در این بررسی شناخته شدند.

واژه‌های کلیدی: آب شرب، آنیون‌ها و کاتیون‌های مخاطره‌آمیز، گاوداری صنعتی، مشهد.

۱. گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

*نویسنده مسئول: moghaddamjafari@um.ac.ir

DOI: [10.22075/jvlr.2025.35757.1135](https://doi.org/10.22075/jvlr.2025.35757.1135)

دریافت: ۱۴۰۳/۰۸/۰۷

پذیرش: ۱۴۰۴/۰۲/۱۷

آلودگی آب شرب دام به برخی عناصر و ترکیبات شیمیایی نه تنها از نظر وقوع مسمومیت در دام بلکه از حیث بهداشت عمومی نیز حائز اهمیت است. علیرغم میزان کم و حلالیت پائین فلزات سنگین (نظیر آرسنیک، سرب، کادمیوم و جیوه)، این عناصر توسط هوازدهی و فرسایش از پوسته‌ی زمین جدا شده و وارد اکوسیستم‌های آبی می‌گردند. رشد روزافزون جمعیت، توسعه صنایع گوناگون، افزایش سطح زیرکشت و استفاده گسترده از کودهای شیمیایی نیز موجب ورود حجم بالایی از آلاینده‌های شیمیایی از جمله فلزات سنگین و ترکیباتی نظیر نیترات و سولفات به محیط‌های آبی شده است. از مهم‌ترین مشکلات ناشی از ورود فلزات سنگین به بدن، متابولیسم نشدن و در نتیجه انباشته شدن آنها در بافت‌هایی نظیر چربی، عضلات، استخوان‌ها و مفاصل و بروز عوارض متعدد ناشی از درگیری اندام‌های مختلف می‌باشد. از وجود واکنش متقابل بین ترکیبات و عناصر موجود در آب با یکدیگر و با ترکیبات مشابه موجود در ساختار جیره، که بعضاً نقش هم‌افزایی یا آنتاگونیستی با یکدیگر داشته و موجب بروز مسمومیت یا بیماری‌های متابولیک در گاو می‌شوند، نیز نباید غافل بود. برخی از آلاینده‌ها، مثل سولفات‌ها نیز با تاثیر نامطلوب بر بو و طعم آب شرب دام، موجب کاهش مصرف آن و صدمه به تولیدات دامی می‌شوند. لذا، تعیین پارامترهای شیمیایی آب به رفع عوارض فوق کمک خواهد نمود. فاضلاب مراکز صنعتی، سوزاندن زغال‌سنگ یا زباله‌ها و آلودگی آب با برخی آفت‌کش‌ها یا علف‌کش‌ها از منابع مهم آلودگی با آرسنیک است. آرسنیک اثرات آنتاگونیست بر ید، جیوه و سرب داشته و می‌تواند موجب کمبود سلیوم و مس شود. آرسنیک یک سم عمومی برای اکثر بافت‌های بدن بوده و مصرف مزمن با آن با علائمی مثل کاهش وزن بدن و تولید شیر، زخم دهان و سقط یا مرده‌زایی همراه است (Beede, 2006; Constable et al., 2017; Olkawski, 2009). منابع اصلی سرب، فرآورده‌های نفتی، باطری‌های مستعمل، برخی آفت‌کش‌ها، رنگ‌های سرب‌دار و معادن سرب می‌باشند. سرب موجود در آب موثرتر از سرب داخل غذا جذب بدن می‌شود. کلسیم، فسفر و آهن اثرات آنتاگونیستی با سرب دارند. ورود سرب به زنجیره غذایی انسان (توسط شیر) موجب بروز نشانه‌های عصبی همچون اختلال در تمرکز و حافظه، خستگی و کم‌خونی می‌شود.

جیوه از طریق فوران آتشفشان‌ها، آفت‌کش‌های حاوی جیوه، ضایعات بیمارستانی و فاضلاب صنعتی وارد محیط شده و مصرف آن می‌تواند باعث صدمه به سیستم عصبی و کلیوی دام شود. متیل جیوه بطور گسترده در محیط‌های آبی یافت شده و از سمیت زیاد و پتانسیل تجمع در بدن دام برخوردار است (Constable et al., 2017; Klasing et al., 2005). کادمیوم به دنبال پاره‌ای از فعالیت‌های صنعتی، استخراج معادن سرب و روی، احتراق زغال سنگ، استفاده از لوله‌های آب کادمیوم‌دار و برخی قارچ‌کش‌ها وارد محیط زیست می‌شود. نیمه عمر این عنصر در بدن زیاد است (۱۰ تا ۲۵ سال در انسان) و با تجمع در بافت‌های کبد، کلیه، ریه، استخوان، بیضه، پوست و خون منجر به کاهش وزن و جراحات پوست، مو و سم دام می‌شود (Constable et al., 2017; Ahmadizadeh fini et al., 2013).

سولفات‌ها نیز از منابع متعدد از جمله پساب کارخانجات صنعتی، کودهای زراعی و آب باران حاوی دود معلق کارخانجات وارد منابع آب می‌گردند. نمک‌های سولفات مسهل بوده و رابطه مصرف آب و غذای حاوی سولفات زیاد با پولیوانسفالومالاسی در گوساله‌ها نیز اثبات شده است (Clark et al., 2001; Yazdani et al., 2017). مواد جامد زائد و فاضلاب انسانی، صنعتی و کشاورزی و کودهای زراعی از متداول‌ترین منابع نیترات می‌باشند. نیترات بالا در آب می‌تواند منجر به افزایش میزان آن در گیاهان محلی و بروز اثر هم‌افزایی آنها می‌شود. کاهش ظرفیت اکسیژن رسانی به بافت‌ها و سقط از مهم‌ترین عوارض مصرف مواد حاوی این آلاینده در نشخوارکنندگان است (Amouei et al. 2014; Olkawski, 2009). طبق منابع قابل دسترس، مطالعات بسیار محدودی در خصوص شناسایی عوامل ضدکیفی آب شرب گاوهای شیری در ایران انجام شده است. در واقع این پژوهش را می‌توان به عنوان سرآغازی برای شناسایی عوامل ضدکیفی موجود در آب آشامیدنی گاوداری‌های حومه مشهد به عنوان نمونه ای از جمعیت گاوداری‌های ایران قلمداد نمود تا بتوان با درک کاستی‌های موجود در این زمینه، توصیه‌های لازم در مورد سد نمودن راه ورود آلاینده‌ها به آب‌های سطحی یا زیرزمینی را ارائه داد و به بهبود کیفیت آب و در نهایت افزایش کمی و کیفی محصولات دامی دست یافت. همچنین، با توجه به وجود واکنش متقابل بین ترکیبات و

عناصر موجود در آب با یکدیگر و با ترکیبات مشابه موجود در ساختار جیره، تعیین پارامترهای کیفی آب به ما در رفع عوارض حاصل از مسمومیت با منابع آبی و به حداقل رساندن برخی از بیماریهای متابولیک دام که ارتباط تنگاتنگی با مقادیر عناصر و املاح مصرفی دارد (نظیر بیماری تب شیر که با کلسیم مصرفی و تفاوت کاتیونی- آنیونی جیره در پیوند است) کمک خواهد نمود.

مواد و روش کار

در ابتدای تابستان سال ۱۳۹۸ از ۳۰ واحد گاوداری صنعتی حومه مشهد نمونه آب به حجم یک لیتر از آب ورودی به آبشخور که اکثراً از منابع زیر زمینی (چاه‌ها) تامین شده اخذ و داخل ظروف پلی‌اتیلینی تمیز که قبلاً با استون شسته شده بود، قرار داده شد و جهت اندازه‌گیری مقادیر فلزات سنگین (سرب، جیوه، آرسنیک و کادمیوم)، نیترات و سولفات، نمونه‌های آب به آزمایشگاه انتقال داده شد. برای حفظ کیفیت آب تا زمان انجام آزمایش، نمونه‌ها دردمای ۴ درجه سانتی‌گراد نگهداری گردیدند و آزمایشات در سریعترین زمان ممکن صورت گرفتند. جهات جغرافیایی و تعداد گاوداری‌های مورد بررسی در هر جهت نسبت به موقعیت شهر مشهد عبارت بودند از: ۸، ۷ و ۷ واحد گاوداری به ترتیب در مناطق غرب (محور نیشابور) شمال شرق (محور کلات)، شمال غرب (محور قوچان) و جنوب (محور فریمان). برای اندازه‌گیری عناصر از دستگاه طیف سنجی نشری پلاسمای جفت شده القایی (ICP-OES) استفاده شد. بدین منظور ابتدا نمونه‌های آب از صافی واتمن ۴۱ عبور داده شد و در داخل فالكون ۵۰ میلی‌لیتری قرار گرفتند. جهت تثبیت عناصر موجود در آب، به ازای هر ۵۰ میلی‌لیتر نمونه آب، ۰/۲۵ میلی‌لیتر اسید نیتریک غلیظ به نمونه‌ها افزوده شد و برای جلوگیری از تماس نمونه‌ها با درب فالكون روی آنها با پارافیلیم پوشانده شد. پس از اندازه‌گیری غلظت عناصر، مقادیر به دست آمده در حافظه دستگاه ذخیره و ثبت گردید. آنالیزها آماری داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۱ انجام شد. جهت انتخاب روش آماری مناسب، از آزمون‌های نرمالیت کولموگوروف- اسمیرنوف (Kolomogorov- Smirnov) و شاپیرو وایک (Shapiro- Wilk) استفاده شد. با توجه به این که در گاوداری‌ها از همان منابع آب مصرفی برای دام، عمدتاً جهت شرب انسان نیز استفاده می‌شد، لذا مقایسه داده‌ها با مقادیر استاندارد (حدود مجاز) ارائه شده توسط موسسه

استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (ترابیان و همکاران، ۱۳۸۸) و سازمان بهداشت جهانی (WHO) و انجمن ملی پژوهش (NRC) (Clark et al, 2001) انجام شد. نتایج تست نرمالیت نشان داد که داده‌های مربوط به مقادیر آرسنیک و جیوه نرمال بوده در حالی که نتایج حاصل از اندازه‌گیری مقادیر چهار مورد دیگر (نیترات، سولفات، سرب و کادمیوم) از توزیع نرمال برخوردار نبودند. لذا جهت مقایسه میانگین مقادیر به دست آمده از دو عنصر فوق با استانداردهای آنها از آزمون پارامتری One- Sample T Test و برای مقایسه متوسط داده‌های مربوط به چهار مورد دیگر با استانداردهای مربوطه، از آزمون ناپارامتری One - sample Wilcoxon signed rank test استفاده شد. همچنین به منظور مقایسه مقادیر فاکتورهای اندازه‌گیری شده در آب شرب با توجه به موقعیت جغرافیایی گاوداری‌های مورد مطالعه نیز تست نرمالیت نشان داد که داده‌های مربوط به آرسنیک و جیوه نرمال بوده، لذا از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (One- way ANOVA) و سپس از آزمون‌های تعقیبی توکی، دانکن و LSD استفاده شد. برای چهار فاکتور دیگر نیز از آزمون‌های ناپارامتری کروسکال- والیس (Kruskal- Wallis) و آزمون مقایسه‌ای من- ویتنی (Mann- Whitney) استفاده شد.

نتایج

پس از ثبت دامنه تغییرات و شاخص‌های آماری مرکزی (جدول ۱)، آنالیز آماری فاکتورهای اندازه‌گیری شده بین مناطق مختلف نشان داد که از نظر عناصر سنگین تفاوت معنی‌داری بین چهار محور جغرافیایی مورد بررسی وجود ندارد ($p < 0/05$)، لذا، آزمون‌های تعقیبی یا مقایسه دو به دو فقط برای دو فاکتور نیترات و سولفات انجام شد (جدول ۲).

در این مطالعه، از ۴ فلز سنگین مورد بررسی، مقدار سرب و جیوه در تمام واحدها (۱۰۰٪) از نمونه‌ها، مقدار کادمیوم در ۱۰ واحد (یک واحد در محور شمال شرق و در هر یک از سه محور دیگر، ۳ واحد) بیش از حد استاندارد بود. همچنین مشخص گردید که در تمام واحدها میزان آرسنیک بیشتر از مقادیر استاندارد ملی ایران (Torabian et al. 2010) و کمتر حد مجاز ذکر شده توسط NRC است. مقادیر نیترات و سولفات در تمام گاوداری‌ها کمتر از مقادیر استاندارد ثبت شد (جدول ۱).

جدول ۱- مقایسه آماری غلظت عناصر اندازه گیری شده در مطالعه حاضر با استانداردها (میلیگرم / لیتر)

فاکتورها	استاندارد	حداکثر - حداقل	میانگین $\pm$ انحراف معیار	میان	P- value
سولفات	۴۰۰	۰/۱۹-۲۳/۶۸	۶/۱۶۸ $\pm$ ۶/۶۸۴	۲/۰۵۵	۰/۰۰۰
	۲۵۰				۰/۰۰۰
نیترات	۵۰	۱/۷۷ - ۱/۱۱	۱/۳۲۷ $\pm$ ۰/۱۷۲	۱/۲۹۵	۰/۰۰۰
	۴۴				۰/۰۰۰
کادمیم	۰/۰۰۳	۰/۰-۰۰۱/۰۰۶	۰/۰۰۲۳ $\pm$ ۰/۰۰۱۳	۰/۰۰۲	۰/۰۰۰
	۰/۰۰۵				۰/۰۰۰
سرب	۰/۰۱	۰/۰-۰۱۱/۰۶۶	۰/۰۳۰ $\pm$ ۰/۰۱۷	۰/۰۲۳	۰/۰۰۰
	۰/۰۱۵				۰/۰۰۰
آرسنیک	۰/۰۱	۰/۰-۰۱۲/۰۳۸	۰/۰۲۵ $\pm$ ۰/۰۰۷	۰/۰۲۵	۰/۰۰۰
	۰/۰۰۵				۰/۰۰۰
جیوه	۰/۰۰۱	۰/۰-۰۱۵/۰۹۶	۰/۰۶۰ $\pm$ ۰/۰۱۸	۰/۰۵۹۵	۰/۰۰۰
	۰/۰۱				۰/۰۰۰

استانداردهای ردیف بالا بر اساس مقادیر اعلام شده توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) و استاندارد ملی ایران و ردیف های پایین بر اساس استانداردهای شورای تحقیقات ملی (NRC) است. $p < ۰/۰۵$ معنی دار است.

جدول ۲- مقادیر شاخص های آماری عناصر اندازه گیری شده در چهار منطقه مورد مطالعه (میلی گرم در لیتر)

فاکتورها	منطقه ی جغرافیایی	حداقل - حداکثر	انحراف معیار $\pm$ میانگین	میان	P- value
سولفات	غرب	۱/۲۹-۱/۸۷	۱/۶۴۲ $\pm$ ۰/۱۸۳	۱/۶۴۵	مقایسه غرب با شمال شرقی - شمال غربی - جنوب ۰/۰۰۱
	شمال شرقی	۱۳/۲۳-۱۹/۶۸	۱۶/۵۲۸ $\pm$ ۱/۹۷۰	۱۶/۴۳	مقایسه شمال شرقی با غرب - شمال غربی ۰/۰۰۱
	شمال غربی	۰/۲۳-۰/۸۳	۰/۵۹۷ $\pm$ ۰/۲۲۲	۰/۶۷۰	مقایسه شمال غربی با غرب - شمال شرقی ۰/۰۰۱
	جنوب	۲/۲۴-۷/۸۲	۵/۰۷ $\pm$ ۱/۸۲	۴/۶۱۰	مقایسه جنوب با شمال شرقی - غرب ۰/۰۰۱ مقایسه جنوب با شمال غربی ۰/۰۰۲
نیترات	غرب	۱/۱۱-۱/۴۱	۱/۲۲ $\pm$ ۰/۱۰۷	۱/۲۰۰	مقایسه غرب با شمال شرقی ۰/۰۰۵
	شمال شرقی	۱/۳۱-۱/۷۷	۱/۴۷ $\pm$ ۰/۱۸۷	۱/۴۰۰	مقایسه شمال شرقی با شمال غربی ۰/۰۰۲ مقایسه شمال شرقی با جنوب ۰/۲۲۴
	شمال غربی	۱/۳۱-۱/۷۷	۱/۲۴ $\pm$ ۰/۰۶۴	۱/۲۳۰	مقایسه غرب با شمال شرقی ۰/۴۸۶ مقایسه شمال غربی با جنوب ۰/۰۸۴
	جنوب	۱/۲۳-۱/۶۴	۱/۳۸ $\pm$ ۰/۱۶۶	۱/۲۸۰	مقایسه غرب با جنوب ۰/۰۲۸
کادمیم	غرب	۰/۰۰۱-۰/۰۰۶	۰/۰۰۲ $\pm$ ۰/۰۰۲	۰/۰۰۱	
	شمال شرقی	۰/۰۰۱-۰/۰۰۳	۰/۰۰۲ $\pm$ ۰/۰۰۰	۰/۰۰۲	
	شمال غربی	۰/۰۰۱-۰/۰۰۵	۰/۰۰۳ $\pm$ ۰/۰۰۱	۰/۰۰۲	
	جنوب	۰/۰۰۱-۰/۰۰۴	۰/۰۰۲ $\pm$ ۰/۰۰۱	۰/۰۰۲	
سرب	غرب	۰/۰۱۵-۰/۰۶۱	۰/۰۴۰ $\pm$ ۰/۰۱۷	۰/۰۴۳	
	شمال شرقی	۰/۰۱۲-۰/۰۶۶	۰/۰۲۷ $\pm$ ۰/۰۱۸	۰/۰۲۲	
	شمال غربی	۰/۰۱۲-۰/۰۴۲	۰/۰۲۲ $\pm$ ۰/۰۱۱	۰/۰۲۱	
	جنوب	۰/۰۱۱-۰/۰۵۸	۰/۰۲۸ $\pm$ ۰/۰۱۷	۰/۰۲۱	
آرسنیک	غرب	۰/۰۱۲-۰/۰۳۳	۰/۰۲۱ $\pm$ ۰/۰۰۸	۰/۰۱۹	
	شمال شرقی	۰/۰۲۵-۰/۰۳۳	۰/۰۳۰ $\pm$ ۰/۰۰۲	۰/۰۳۰	
	شمال غربی	۰/۰۱۶-۰/۰۲۸	۰/۰۲۲ $\pm$ ۰/۰۰۴	۰/۰۲۲	
	جنوب	۰/۰۱۴-۰/۰۳۸	۰/۰۲۶ $\pm$ ۰/۰۰۸	۰/۰۲۵	
جیوه	غرب	۰/۰۴۱-۰/۰۷۷	۰/۰۵۶ $\pm$ ۰/۰۱۴	۰/۰۵۳	
	شمال شرقی	۰/۰۵۲-۰/۰۸۸	۰/۰۷۲ $\pm$ ۰/۰۱۰	۰/۰۷۲	
	شمال غربی	۰/۰۴۵-۰/۰۶۲	۰/۰۵۴ $\pm$ ۰/۰۰۶	۰/۰۵۵	
	جنوب	۰/۰۱۵-۰/۰۹۶	۰/۰۵۸ $\pm$ ۰/۰۳۰	۰/۰۷۱	

$p < ۰/۰۵$ معنی دار است.

در این مطالعه مشخص شد که میزان سولفات و نیتрат موجود در آب شرب گاوداری‌های تحت بررسی در منطقه شمال شرق و جنوب به طور معنی‌داری بیشتر از منطقه غرب و در آب شرب واحدهای واقع در محور شمال شرق بیشتر از شمال غرب مشهد می‌باشد ($p < 0.05$). به عبارت دیگر در مقایسه دو به دو در مناطقی که هر دو فاکتور تغییرات معنی‌داری داشته‌اند، بیشترین آلودگی به ترکیبات فوق در منطقه شمال شرق (محور کلات) وجود دارد. همچنین کمترین آلودگی به سولفات در منطقه شمال غرب مشهد (محور قوچان) و کمترین مقدار نیترات در نمونه‌های آب شرب منطقه غرب مشهد (محور نیشابور) ثبت شد (جدول ۲ و ۳).

بحث

یکی از مهم‌ترین عوامل جهت بقای حیات، رشد مطلوب، حفظ شیردهی و تولیدمثل گاو شیری، آب شرب دام است. با این حال، دامداران به آن اندازه که به توازن مواد مغذی در جیره‌ی دام خود اهمیت می‌دهند، به کیفیت آب شرب دام‌های خود توجه نمی‌کنند و اغلب زمانی به آن پرداخته می‌شود که مشکلی رخ داده باشد. چنانچه آب مصرفی از کیفیت ضعیفی برخوردار باشد، با توجه به حجم بالای آب شرب گاوها به ویژه در گاوهای شیری پرتولید (تا ۱۱۵ لیتر در روز) در مقایسه با دیگر مواد مغذی، احتمال بروز صدمه به سطح تولید و کیفیت تولیدات دامی، بسیار افزون‌تر خواهد شد (Olkawski, 2009; Morgan, 2011). مطالعه حاضر نشان داد که میزان آلاینده‌ی آب شرب گاوداری‌ها به عناصر سنگین تحت بررسی به طور معنی‌داری بیش از استانداردهاست و توجه به آن ضروری است. همچنین بیشترین میزان سرب، آرسنیک، کادمیوم، جیوه، سولفات و نیترات به ترتیب در نمونه‌های آب اخذ شده از گاوداری‌های واقع در شمال شرق، جنوب، غرب، جنوب، شمال شرق و شمال شرق مشهد مشاهده شد (جدول ۲).

با مشاهده‌ی نتایج حاصل از بررسی کیفیت آب چاه‌های موجود در محدوده تالاب آنزلی مشخص می‌شود که میانگین آلودگی به سرب و جیوه در مطالعه فوق (به ترتیب ۰/۰۱۲ و ۰/۰۲۱ میلی‌گرم در لیتر) کمتر از یافته‌های این پژوهش است. به نظر می‌رسد حضور صنایع مختلف در

حومه مشهد در افزون بودن میزان آلودگی به سرب و جیوه در این مطالعه نقش داشته باشد (Vatandoost et al., 2018). همچنین مقایسه نتایج مربوط به مقادیر فلزات سنگین در آب سی حلقه چاه موجود در منطقه بهبهان نیز نشان می‌دهد که مقادیر متوسط سرب و کادمیوم (۰/۲۱۵ و ۰/۴۸۴ میلی‌گرم در لیتر) بیشتر و میزان آرسنیک (۰/۰۰۹ میلی‌گرم در لیتر) کمتر از مطالعه حاضر است. محققین فوق، آلودگی بالای آب به سرب را به دخالت انسان و کادمیوم را به فاضلاب شهری، کارگاهی و کارخانه‌ای ربط دادند (Marbooti et al., 2015).

در پژوهشی دیگر که بر روی آب شرب مناطق روستایی بندرعباس انجام شد علت افزایش غلظت کادمیوم در ۵۲ درصد از نمونه‌های آب چاه، استفاده از کودهای کشاورزی، سموم شیمیایی و فاضلاب انسانی اعلام شد (Ahmadizadeh Fini et al., 2013). در مطالعه انجام شده در ترکیه، بالا بودن غلظت سرب و کادمیوم در نمونه‌های شیر گاوها و آب شرب اخذ شده از مزارع مختلف و در فصول متفاوت (مقادیر حداکثری در آب شرب برای دو عنصر فوق به ترتیب ۰/۰۳۸ و ۰/۰۶۳ میلی‌گرم در لیتر)، به آلودگی مراتع با سوخت و وسائل نقلیه، وجود شهرک‌های صنعتی و میزان بارندگی ربط داده شد و عنوان شد که در فصول بارندگی نفوذ فلزات سنگین به آب‌های زیرزمینی در افزایش آلودگی آب موثر است (Bigucu et al., 2016).

در مطالعه‌ی صورت گرفته بر روی آب‌های زیرزمینی شهر بابل نیز مشخص شد که میانگین غلظت نیترات در منابع آب شرب شهری و روستایی در فصول تابستان و زمستان متفاوت بوده و افزایش آن با مصرف کودهای شیمیایی در فصل کشاورزی، پرورش دام در منازل، رعایت نکردن حریم بهداشتی چاه‌ها و ریختن زباله در اطراف منازل در پیوند است (Amouei et al. 2014). در پژوهشی دیگر که بر روی آب‌های زیرزمینی دشت مشهد انجام شد، مهم‌ترین علت افزایش قابل توجه نیترات در آب چاه‌های واقع در مناطق شهری پرجمعیت در مقایسه با مناطق کشاورزی (با میانگین ۳۱/۵ در مقابل ۸/۶ میلی‌گرم در لیتر) نشت فاضلاب خانگی اعلام شد و کمترین مقدار نیترات در

قسمت غربی دشت مشهد گزارش گردید که با یافته‌های این مطالعه همخوانی دارد (Latif et al. 2005).

همچنین، نتایج یک مطالعه از نظر مقادیر سولفات موجود در آب‌های زیرزمینی دشت مشهد نشان داد که در مجموع حدود ۸۱ درصد از سطح منطقه از وضعیت کیفی خوب و قابل قبولی برخوردار است و فقط بخش‌هایی از شمال و جنوب شهر مشهد شرایط نامساعدی را تجربه می‌کنند. در بررسی اخیرالذکر، شیب هیدرولیکی زمین به سمت جنوب و تجمع جمعیت در این ناحیه همراه با دفع غیراصولی پساب شهری و صنعتی از عوامل افت کیفی آب در بخش جنوبی دشت مشهد محسوب شد و به خشکسالی‌های متوالی که موجب استحصال بیشتر از منابع آب زیرزمینی، محدودیت در تغذیه این منابع آبی و تغلیظ ترکیباتی مثل سولفات در آن، نیز به عنوان فاکتوری موثر در کاهش کیفیت آب‌های زیرزمینی اشاره شد (Morgan, 2011; Yazdani et al., 2017). گرچه مقادیر سولفات در مطالعه حاضر به طور معنی داری کمتر از حد مجاز می‌باشد ولی از آنجایی که بسیاری از اقلام جیره نشخوارکنندگان همچون یونجه، کنجاله سویا و ملاس حاوی سولفور می‌باشند، بنابراین باید مجموع سولفور موجود در آب و غذا را در نظر گرفت (Olkawski, 2009).

در مطالعه حاضر، افزایش معنی‌دار داده‌های مربوط به پارامترهای اندازه‌گیری شده در مناطق جغرافیایی مورد بررسی نسبت به استانداردها می‌تواند به دلایلی به این شرح باشد:

الف- وجود شهرک‌های صنعتی مثل شهرک صنعتی کلات در منطقه شمال شرق در مجاورت کَشَف رود، شهرک صنعتی طوس در منطقه شمال غرب (محور قوچان) و دیگر شهرک‌های صنعتی اطراف مشهد که صنایع مختلف از جمله باتری‌سازی، رنگ‌سازی، دباغی پوست و غیره را در خود جای داده و پتانسیل ورود آلاینده‌های ارگانیک و غیرارگانیک به ویژه فلزات سنگین به محیط زیست را دارند.

ب- وجود نیروگاه‌های حرارتی مختلف مثل نیروگاه حرارتی طوس و فردوسی در محور قوچان و نیروگاه شریعتی در جاده سرخس (در مجاورت گاوداری‌های بزرگ منطقه). قابل

ذکر آن که گازهای حاصل از این نیروگاه‌ها می‌تواند آلاینده‌های آلی و غیرآلی مثل فلزات سنگین را وارد محیط پیرامون خود کنند، ضمن این که وزش باد از جهت غرب به شرق نیز در انتقال گاز آگروز این نیروگاه‌ها به مناطق شرق و شمال شرق تأثیرگذار خواهد بود.

پ- از دیگر مسائل، ورود آلاینده‌های کارگاه‌ها و کارخانجات صنعتی به کال‌ها و مسیل‌های حومه مشهد بوده که نهایتاً تمامی آن‌ها به کَشَف رود (یکی از مخازن اصلی آب مورد استفاده گاوداری‌های مستقر در شرق و شمال شرق مشهد) می‌ریزند.

ت- آلودگی مراتع و زمین‌های حاشیه بزرگراه‌ها (مثل بزرگراه پرترافیک آسیایی واقع در شمال و شمال غرب مشهد که به سمت محور نیشابور نیز کشیده شده) با فلزات سنگین و یا تعویض روغن ماشین‌های شهری و صنعتی در حومه شهرها و در کنار مسیل‌ها از دیگر موارد مهم می‌باشد. نباید فراموش کرد که سالیان آب می‌تواند منجر به انتقال آلودگی خاک و گیاهان به منابع آبی شود.

ث- حجم بالای کشاورزی و دامپروری و وجود صنایع آلاینده مثل چرم‌سازی و باتری‌سازی و افزایش حاشیه نشینی در مناطق مختلف مشهد از جمله محدوده شمال شرق در افزایش سولفات و نیترات در این منطقه نسبت به دیگر مناطق می‌تواند نقش آفرین باشد.

ج- اقلیم خشک و نیمه خشک ایران موجب شده که بخش اعظم آب شرب از منابع زیرزمینی تامین شود. در مطالعه حاضر نیز اکثر قریب به اتفاق واحدها از آب چاه بهره می‌برند. بنابراین جنس خاک و سنگ منطقه را نیز در تغییرات غلظت آلاینده‌های شیمیایی با توجه به شستشوی خاک توسط نزولات آسمانی باید مد نظر قرار داد (Ahmadizadeh Fini 2013, Yazdani et al. 2017).

یکی دیگر از مسائل قابل استنباط از این مطالعه، الگوی بسیار متغیر پراکنش آلاینده‌های مختلف در اطراف شهر مشهد است؛ به عبارت دیگر، فراوانی داده‌ها نه تنها بین مناطق مختلف، بلکه حتی در یک منطقه خاص نیز زیاد است به صورتی که در مورد فلز جیوه بیشترین و کمترین میزان اعلام شده مربوط به یک منطقه (جنوب مشهد) می-

باشد. این موضوع می‌تواند ناشی از تامین آب شرب یک منطقه از منابع مختلف آبی (مثل آب سطحی سد طرق و یا زیرزمینی) یا بیانگر تنوع بیش از حد چاه‌ها از لحاظ کیفیت شیمیایی آب آن‌ها باشد. از آنجایی که فعالیت‌های فصلی به ویژه در امور کشاورزی بسیار می‌تواند در حجم آلاینده‌گی آب شرب دام‌ها موثر باشد، بنابراین صرف پایین بودن برخی از عناصر در مطالعه حاضر به جهت نگاه نقطه‌ای از نظر زمان نمی‌تواند ما را به این نتیجه برساند که مشکلی در این زمینه وجود ندارد، بلکه جهت ارزیابی دقیق‌تر سنجش‌های فصلی نیز ضروری به نظر می‌رسد.

یافته‌های این مطالعه نشان داد که مناطق شمال شرق و جنوب مشهد در مقایسه با دیگر مناطق نیازمند توجه بیشتر از نظر فلزات سنگین و سولفات و نیتрат می‌باشند، لذا برای کاستن از اثرات ناگوار این آلاینده‌های شیمیایی بر بهداشت دام و انسان توجه به نکاتی از جمله آگاه‌سازی صنایع و مشاغل با چگونگی دفع صحیح فاضلاب صنعتی و نظارت جدی بر عملکرد آنها، توجه به زیرساخت‌های مراکز جمع-آوری زباله و رعایت فاصله مجاز این مراکز از مسیل‌ها، ترمیم زیرساخت‌های لوله‌کشی و ایزولاسیون مخازن سپتیک و فاضلاب از مخازن آب شرب، بازیافت تولیدات حاوی فلزات سنگین، حائز اهمیت می‌باشد.

نتیجه گیری

یافته‌های این پژوهش نشان داد که غلظت آنیون‌های نیترات و سولفات در آب شرب گاوداری‌های شیری حومه مشهد پایین‌تر از حد مجاز و در محدوده ایمن بوده است؛ با این حال، مقادیر فلزات سنگین به‌ویژه آرسنیک، سرب و جیوه در تمامی واحدها و کادمیوم در بخشی از آن‌ها بالاتر از استانداردهای موجود گزارش شد. این امر بیانگر وجود منبع یا منابع مشترک و گسترده آلودگی در منطقه است که می‌تواند سلامت دام و کیفیت شیر تولیدی را تهدید کند. از سوی دیگر، حضور صنایع بزرگ، نیروگاه‌های حرارتی، ترافیک سنگین بزرگراه‌ها و مصرف بی‌رویه کودهای شیمیایی از عوامل احتمالی آلودگی منابع آب زیرزمینی محسوب می‌شوند. بنابراین، پایش مستمر کیفیت آب، مدیریت صحیح پساب‌های صنعتی و کشاورزی، و استفاده از

منابع آب سالم‌تر، از اقدامات ضروری جهت ارتقای بهداشت دام، بهبود کیفیت شیر و کاهش خطرات ناشی از فلزات سنگین در زنجیره تولیدات دامی به شمار می‌رود.

تشکر و قدر دانی

از دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد جهت تامین اعتبار مالی انجام این پایان نامه قدردانی مینماییم. همچنین از خانم دکتر کریمانی که در بازبینی مقاله همکاری داشتند کمال تشکر را داریم.

تعارض منافع

نویسندگان این مقاله هیچ‌گونه تضاد منافی ندارند.

مشارکت‌های نویسندگان

نسیم میربلوک: نویسنده و مجری طرح
امیر مقدم جعفری: نویسنده مسؤول، ارایه طرح و ارزیابی و نوشتار نهایی مقاله

منابع مالی

اعتبارات این طرح توسط دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد تامین گردیده است.

References

- Ahmadizadeh Fini, A., Razmand, N., & Zamani, A. (2013). Evaluation of heavy metal concentrations (Zn, Cd, Pb) in drinking water wells in the rural areas of Bandar Abbas, Iran. *Hormozgan Medical Journal*, 18(3), 239–245.
- Amouei, A. I., Tabarinia, H., Khalilpour, A., Faraji, H., & Mohammadi, A. A. (2014). Determine the concentration of nitrate and nitrite in drinking water in rural and urban areas of Babol city (2012). *Journal of Babol University of Medical Sciences*, 16(11), 70–77.
- Beede, D. K. (2006). Assessment of water quality and nutrition for dairy cattle. In *High Plains Dairy Conference* (pp. 1–23). Michigan State University, East Lansing, MI.
- Bigucu, E., Katan, B., Palabiyik, I., & Oksuz, O. (2016). The effect of environmental factors on heavy metal and mineral compositions of raw milk and water samples. *Journal of Tekirdag Agricultural Faculty*, 13(4), 61–70.
- Clark, J. H., et al. (2001). *Nutrient requirements of dairy cattle: 7th revised edition*. Subcommittee on Dairy Cattle Nutrition, Committee on Animal Nutrition, National Research Council. National Academy Press. <https://www.nap.edu>
- Constable, P. D., Hinchcliff, K. W., Done, S. H., & Grunberg, W. (2017). *Veterinary medicine* (11th ed.). Saunders Ltd.
- Klasing, C. K., et al. (2005). *Mineral tolerance of animals: Committee on minerals and toxic substances in diets and water for animals* (2nd ed.). National Academic Press. <https://www.nap.edu>
- Latif, M., Mousavi, S. F., Afyuni, M., & Velayati, S. (2005). Investigation of nitrate pollution and sources in groundwater in Mashhad plain. *Journal of Agricultural Science and Natural Resources*, 12(2), 21–32.
- Marbooti, Z., Khavari, R., & Ehya, F. (2015). Heavy metal contamination assessment of groundwater resources in Behbahan plain southwest Zagros. *Open Journal of Geology*, 5, 325–330. <https://doi.org/10.4236/ojg.2015.55029>
- Morgan, S. E. (2011). Water quality for cattle. *Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice*, 27(2), 285–295. <https://doi.org/10.1016/j.cvfa.2011.02.002>
- Olkowski, A. A. (2009). *Livestock water quality: A field guide for cattle, horses, poultry and swine* (pp. 1–126). Agriculture and Agri-Food Canada, University of Saskatchewan.
- Torabian, A., et al. (2010). *Drinking water—Physical and chemical specifications* (5th ed., National Standard No. 1053). Institute of Standards and Industrial Research of Iran. (In Persian)
- Vatandoost, M., Naghipour, D., Omid, S., & Ashrafi, S. A. (2018). Survey and mapping of heavy metals in groundwater resources around the region of the Anzali international wetland: A dataset. *Data in Brief*, 18, 463–469. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2018.03.049>
- Yazdani, M. R., Koohbanani, H. R., Dashti Amirabad, J., & Aziminejad, M. (2017). Evaluation of groundwater quality indicators in Mashhad plain using geostatistics and GIS techniques. *Journal of Neishabour University of Medical Sciences*, 5(3), 63–73.